

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 26-3-63 200035

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,  
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artiques, CENON (Gironde)  
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

ABONNEMENT ANNUEL  
15 NF

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 30 de Mars 1963

1963-5

## AVERTISSEMENTS

## ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : La végétation continue son évolution et les Périthèces de la Tavelure du Poirier arrivent à maturité en toute région. Des projections d'Ascospores ont même été observées au cours des dernières pluies.

Pour prévenir les contaminations nous conseillons un premier traitement général sur toutes les variétés de Poiriers.

Traiter à nouveau les variétés précoces en raison des pluies abondantes qui ont pu délayer les produits.

Sur les Pommiers où l'on note la maturité des premiers Périthèces, ne traiter que les variétés bien débouffées.

## INFORMATIONS

Oïdium du Pommier : Nous rappelons que les premières contaminations peuvent avoir lieu après le débournement.

Sur les variétés sensibles on pourra utiliser l'une des spécialités indiquées dans la liste des produits homologués.

Anthracose du Pommier : Les attaques de l'Anthracose sont irrégulières mais dans les vergers où des dégâts ont été observés en 1962, on pourrait appliquer une spécialité à base d'H.C.H., de Lindane ou de D.D.T. sur les variétés qui auront atteint le stade dit " bourgeon blanc ".

Cloque du Prunier : Pour prévenir la déformation des jeunes fruits (maladie des Pochettes), un traitement est conseillé sur Prunier entre le débournement et de stade du bouton blanc. Utiliser une spécialité Organo-Cuprique ou Organique de synthèse.

Maladie Criblée - Monilia et Gnomonia du Cerisier : Ces maladies peuvent être prévenues par l'application d'un produit cuprique ou d'une Bouillie Sulfocalcique avant la floraison puis après la chute des pétales.

En ce qui concerne le Gnomonia il est conseillé d'enlever les feuilles desséchées encore présentes sur les branches.

Bordeaux, le 23 Mars 1963

Le Contrôleur chargé des Avertissements

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

C. ROUSSEL

J. BRUNETEAU

Imprimerie de la Station de Bordeaux, Directeur-Gérant: L. BOUYX

P 91